

VACCIN ROTATEQ Fiche de renseignements à l'intention du vaccinateur (vaccin pentavalent oral à virus vivant contre le rotavirus, Merck Canada Inc.)	
Critères d'admissibilité pour le vaccin contre le rotavirus financé par l'État	<ul style="list-style-type: none"> Les nourrissons nés à compter de 2017 et dont l'âge satisfait aux exigences (la première dose doit être administrée avant 15 semaines et la série doit être complétée avant l'âge de 8 mois) peuvent recevoir le vaccin oral antirotavirus. REMARQUE: À compter du 1^{er} mai 2018, les nourrissons qui n'ont pas reçu une dose de vaccin antirotavirus et qui satisfont aux exigences relatives à l'âge vont recevoir le nouveau produit RotaTeq.
Dosage, emballage, conservation et stabilité	<ul style="list-style-type: none"> Suspension orale (2,0 ml) dans un tube souple. Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler. Conserver dans le contenant d'origine afin de protéger le produit de la lumière. La date d'expiration figure sur l'étiquette et sur l'emballage. Le contenant et l'embout distributeur ne contiennent pas de latex.
Intervalles d'administration	<ul style="list-style-type: none"> Une série de trois doses administrées à deux, à quatre et à six mois conformément au calendrier d'immunisation systématique. Intervalle minimal de quatre semaines entre chaque dose. <ul style="list-style-type: none"> <u>1^{re} dose</u> : L'âge minimal est de six semaines, l'âge maximal est avant 15 semaines. <u>2^e dose</u> : L'âge minimal est de dix semaines <u>3^e dose</u> : L'âge maximum est avant 8 mois Remarque : Étant donné que les deux vaccins diffèrent en composition et en calendrier, la série vaccinale devrait être complétée avec le même produit, si possible. Dans le cas où une dose aurait été administrée avec le vaccin RotaTeq (Rot-5), trois doses au total de vaccin devraient être administrées. Si la première dose était Rotarix[™] et Rotarix[™] n'est pas disponible, complétez le calendrier avec deux doses de RotaTeq.
Administration	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE SEULEMENT. Peut être administré au même moment que les autres vaccins systématiques. Peut être administré aux personnes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Bébés allaités. Bébés vivant dans le même foyer qu'une femme enceinte. Bébés nés avant terme en santé. Si un vaccin antirotavirus est craché, il ne faut pas en administrer une nouvelle dose parce qu'on n'en connaît pas l'innocuité. De préférence donner le Rotateq en premier des autres vaccins.
Précautions et contre-indications	<ul style="list-style-type: none"> Antécédents d'anaphylaxie par suite d'une administration préalable du vaccin; ou présentant une hypersensibilité immédiate prouvée ou une hypersensibilité anaphylactique à tout composant du vaccin ou à son contenant. Immunodépression et les patients infectés par le VIH. Antécédents d'invagination (intussusception). Troubles abdominaux congénitaux non corrigés (qui augmentent le risque d'invagination). Syndrome d'immunodéficience combinée grave. Diarrhées ou vomissements (le vaccin devrait être retardé temporairement). Un traitement immunosuppresseur pendant la grossesse ou l'allaitement.
Effets secondaires possibles	<ul style="list-style-type: none"> Irritabilité, fièvre, perte d'appétit, vomissements et diarrhée. Invagination (faible risque accru de un à sept cas pour 100 000 doses administrées).

****Consultez « Vaccination avec RotaTeq - Questions & réponses à l'intention des vaccinateurs » et la monographie du produit pour plus de détails****